

Iver Dual Gel

Uso Veterinario

Gel de uso oral

Composición:

Cada jeringa de 9,6 g contiene:

Ivermectina	0,12 g
Prazicuantel	1,50 g
Vitamina E	0,60 g
Excipientes c.s.p.	9,60 g

Gyalocephalus spp,
Cylicodontophorus spp,
Cylicostephanus spp,
Cylicocyclus spp.

Nematodo pulmonar:

Dictyocaulus arnfieldi.

Indicaciones:

IVER DUAL GEL es indicado en el tratamiento y control de los parásitos de los equinos como:

Nematodos

gastrointestinales:

Habronema spp,
Trichostrongylus axei,
Parascaris equorum,
Strongyloides westeri, *Oxyuris equi*, *Onchocerca* spp.

Grandes estróngilos:

Triodontophorus spp,
Strongylus vulgaris,
Strongylus equinus,
Strongylus edentatus.

Pequeños strongylideos

Cyathostominae:

Cyathostomum spp,

Cestodos:

Anoplocephala spp, *Paranoplocephala mamillana*, *Paranoplocephala perfoliata*.

Larvas de moscas:

Gasterophilus nasalis.

Habronemosis:

Habronema spp, *Draschia* spp y sus larvas.

Modo de uso y dosificación:

IVER DUAL GEL debe ser administrado por vía oral solamente en equinos. Cada signo en el émbolo de la jeringa (1,6 g) suministra gel suficiente para tratar 100 kg de masa corporal; es decir, 20 mg de Ivermectina, 250 mg de Prazicuantel y 100 mg de Vitamina E por kilo de

peso corporal; una jeringa es suficiente para tratar un caballo de 600 kg. Antes de la administración, asegúrese que el caballo no tiene comida en la boca. Ponga la jeringa en la boca y deposite el gel sobre la lengua. Mantenga la cabeza del caballo para arriba durante algunos segundos tras la dosificación.

Administrar en dosis única.

Precauciones:

No tirar los envases vacíos en ríos o lagunas. El producto es tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar comer o fumar al administrar el producto.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa, en temperatura ambiente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS.

Interacción medicamentosa:

La Dexametasona disminuye la eficacia del Prazicuantel.

Reacciones adversas:

El producto no tiene reacciones adversas cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones.

Tiempo de Retiro:

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Responsable Técnica:

Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

Registros:

México: SAGARPA
Q-7750-058



Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil