

Folltropin®-v

Número de Registro Q-7090-124

GAMA
REPRODUCCIÓN

Hormona Folículo Estimulante



Extracto de folitropina hipofisaria de origen porcino.

FÓRMULA:

Hormona Folículo Estimulante.....400 mg NIH-FSH-P1
Diluyente estéril.....20 ml
La solución reconstituida contiene 20 mg de FSH/ml.

ESPECIES DE DESTINO:



Bovinos
(carne y leche)

INDICACIONES:

Inducción de superovulación en novillas y en vacas reproductivamente maduras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía intramuscular.

Protocolo: Antes de la administración, se debe reconstruir **Folltropin®-V** con el di-

luyente. La reconstitución del producto y la succión de la solución en la jeringa, deben llevarse a cabo de acuerdo con una estricta técnica aséptica.

El tratamiento debe comenzar dentro de 8 a 10 días después de la aparición de calor natural o inducido.

Administrar 2.5 ml (50 mg de FSH) de **Folltropin®-V** dos veces al día, durante cuatro días. Al momento de administrar la sexta dosis de **Folltropin®-V**, aplicar simultáneamente una prostaglandina de tipo F2α, o un análogo de la misma para provocar luteolisis.

Después de la aparición de los signos del estro, se debe realizar el apareamiento de los animales o la inseminación artificial. La recolección de los embriones comienza normalmente, siete días después de los signos del estro o del primer apareamiento.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Folltropin®-V es un extracto purificado de FSH obtenida a partir de hipófisis porcinas seleccionadas cuidadosamente. Este extracto se encuentra liofilizado, con el fin de preservar sus propiedades al someterlo a condiciones normales de almacenamiento. Cada vial de 20 ml contiene el equivalente a 400 mg de FSH (estándar NIH-FSH-P1).

Se ha demostrado que la relación entre FSH (hormona folículo estimulante) y LH (hormona luteinizante) en extractos hipofisarios, podría afectar la respuesta de los ovarios sometidos a un tratamiento con gonadotropinas exógenas. La tasa media de ovulación disminuye a medida que la relación LH:FSH se incrementa. **Folltropin®-V** es uno de los productos mas seguros por su bajo contenido de LH.

CONTRAINDICACIONES:

- No administrar en caso de presentar hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- No utilizar en hembras gestantes o en jóvenes reproductivamente inmaduras.
- No utilizar este producto en cerdos.

ADVERTENCIAS:

En el caso de una reacción de hipersensibilidad, administrar epinefrina.

PRECAUCIONES:

En caso de ingestión accidental o cualquier problema relacionado a la exposición del producto, consultar al médico inmediatamente y mostrar la información del mismo.

El recipiente vacío y el producto remanente se deben eliminar siguiendo la normatividad vigente en materia de residuos.

PERIODO DE RETIRO:

- Carne: 10 días
- Leche: cero días

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a una temperatura entre 15 y 30° C, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Una vez reconstituido se debe conservar en refrigeración, entre 2 y 7° C por no más de 5 días.

PRESENTACIÓN Y FORMA FARMACÉUTICA:

Frasco con liofilizado (400 mg) y frasco con diluyente (20 ml).

ARBiotech®
Animal Reproduction Biotechnology

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
CUANTIFICADA.
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO
VETERINARIO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
USO VETERINARIO.