

PNEUMABORT-K® + 1B

Reg. B-1196-129. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Vacuna contra la Rinoneumonitis Equina. Virus Inactivado.

FÓRMULA

PNEUMABORT-K® + 1B contiene:

Herpesvirus Equino 1 - Cepa A-183
Herpesvirus Equino 1 - Cepa T-480

DESCRIPCIÓN

Vacuna a virus inactivado contra la Rinoneumonitis Equina.

INDICACIONES

Para la vacunación por vía intramuscular de caballos sanos de 9 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de las enfermedades respiratorias causadas por los virus EHV-1p cepa A-183 y EHV-1b cepa T-480, así como para el uso en yeguas gestantes como ayuda en la prevención del aborto causado por las infecciones por EHV-1.

PRESENTACIÓN

Caja con 12 jeringas de 2 ml (1 dosis cada una)

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- Yeguas gestantes:** administrar asépticamente una dosis de 2 ml por vía intramuscular durante el quinto, séptimo y noveno mes de la gestación. Revacunar anualmente durante el quinto, séptimo y noveno mes de la gestación.
- Caballos jóvenes:** administrar asépticamente una dosis de 2 ml vía intramuscular después del destete, seguido de una segunda dosis de 2 ml de 3 a 4 semanas después. Revacunar con una sola dosis de 2 ml 6 meses después de la segunda dosis primaria y después, anualmente.
- Para la correcta aplicación, inyectar profundamente en los músculos pesados del cuarto trasero. Verifique que la aguja no esté en algún vaso sanguíneo. Para promover la absorción se recomienda ejercicio leve durante una semana después de la inyección.

PRECAUCIONES / ADEVERTENCIAS


- Utilizar todo el contenido una vez abierto.
- No vacunar dentro de los 60 días anteriores al sacrificio.
- Contiene Timerosal, Neomicina, Polimixina B y Anfotericina B como agentes conservantes.
- De vez en cuando puede resultar una inflamación o induración local en el sitio de inyección.
- Agitar vigorosamente para asegurar la suspensión uniforme de la vacuna.
- En caso de reacción anafilactoidea, administrar epinefrina.
- Las yeguas gestantes que están en contacto con yeguas que han abortado fetos infectados con el herpesvirus equino 1 deben ser

vacunadas. Dicha vacunación puede proporcionar inmunidad para aquellas yeguas dentro del grupo que no están incubando una infección por agentes causales de aborto al momento de la vacunación.

- Consulte al Médico Veterinario.**
- Su venta requiere receta médica.**

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en la oscuridad entre 2 y 7 °C (35 y 45 °F).
- Evitar congelación.
- Utilizar todo el contenido una vez abierto.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



INDICADO EN

