

MEX

GUÍA RÁPIDA



FICHAS TÉCNICAS

ANALGÉSICOS	1
ANTIBIÓTICOS	1
ANTIINFLAMATORIOS	1
ANTIMASTÍTICOS	2
SISTEMA DIGESTIVO	2
BIOLÓGICOS	3
CARDIOLOGÍA	3
REPRODUCCIÓN	4,5
VITAMINAS Y MINERALES	6,7
ANTIPARASITARIOS	8

“INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO”



ANALGÉSICOS

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 BUTORFANOL CALIER  Q-7965-135	Solución inyectable indicado como analgésico y sedativo para dolores severos pre-post quirúrgicos y preanestésico. Frasco con 10 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada ml contiene: Butorfanol (como tartrato) 10 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	Equinos: 0.02 - 0.1 mg/kg de peso por vía IV o IM. Caninos (Perros): 0.1 - 0.4 mg/kg de peso vía IM; por vía IV 0.1 mg/kg de peso. Felinos (Gatos): 0.1 - 0.4 mg/kg de peso vía SC, por vía IV de 0.1 mg/kg de peso.

ANTIBIÓTICOS

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIMINAZENO OX CALIER  Q-7965-068	Solución inyectable indicado para el tratamiento de enfermedades como la anaplasmosis, piroplasmosis, tripanosomiasis provocada por protozoarios, actúa como antibiótico en caso de infecciones antibacterianas mixtas, es eficaz contra gérmenes Gram +, Gram -, y además contra la fiebre, asegurando una rápida recuperación. Frasco con 50 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada ml contiene: Diminazen diacetato 35 mg Oxitetraciclina base 70 mg Antipirina 187.5 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	1 ml por cada 10 kg de peso vivo para anaplasmosis, piroplasmosis y tripanosomiasis. En enfermedades bacterianas, aplicar 1 ml por cada 20 kg de peso por 3 a 5 días. Vía intramuscular profunda.
 ROXACIN INECTABLE  Q-7965-085	Solución inyectable para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes susceptibles a la enrofloxacin. Frasco con 250 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contienen: Enrofloxacin. 10 g Vehículo c.b.p. 100 ml	Cerdos: 0.25 ml por cada 10 kg de peso cada 24 horas durante 3-5 días. Bovinos: 0.25 ml por cada 10 kg de peso cada 24 horas durante 5 días. Vía intramuscular.

ANTIINFLAMATORIO

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 RETARDOESTEROIDE  Q-7965-084	Es una suspensión inyectable indicada para inflamaciones originadas por infecciones, alergias, traumatismos u otras etiologías. Bovinos: cetosis. Frasco con 50 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contienen: Triamcinolona acetónido 0.2 g Vehículos y Estabilizantes c.b.p. 100 ml	Vía intramuscular o subcutánea: Equinos: 0.01-0.02 ml/kg en dosis única. Perros y gatos: 0.05-0.1 ml/kg en dosis única. Vacas lecheras: 10 ml por animal en dosis única. Vía intraarticular o intrasinovial: Equinos: 3-9 ml en dosis única. Perros y gatos: 0.5-1.5 ml en dosis única.
 MAMASANA  Q-7965-112	Ungüento para el tratamiento local de ubres inflamadas, pezones cuarteados y heridas de la ubre causadas por golpes y contusiones. Alivia inflamaciones musculares y articulares ocasionados por traumas, torceduras, esguinces y reumatismo articular. Tarro con 200 g SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 g contienen: Aceite de eucalipto 2.20 g Esencia de trementina 6.00 g Fenol 3.50 g Lanolina Anhidra 10.00 g Salicilato de metilo 1.80 g Excipiente c.b.p. 100.00 g	Aplíquese generosamente en la parte afectada 2 veces al día. Vía tópica.

ANTIMASTÍTICOS

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 CLOXACUM Q-7965-086	Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis causadas por gérmenes susceptibles a la Cloxacilina. Cubeta con 36 jeringas de 10 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada jeringa de 10 ml contiene: Cloxacilina (benzatina) 500 mg Vehículo oleoso c.b.p. 10 ml	Aplicar 1 jeringa (10 mL) por cada cuarto afectado, en dosis única. Vía intramamaria
 CLOXAMBIOTIC Q-7965-093	Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis producidas por los gérmenes siguientes: Bacterias Gram positivas: <i>Staphylococcus aureus</i> (incluido cepas penicilina resistentes); <i>Streptococcus</i>; <i>Listeria monocytogenes</i>; <i>Bacillus anthracis</i>. Bacterias Gram negativas: <i>Haemophilus influenzae</i>; <i>Escherichia coli</i>; <i>Salmonella spp</i>; <i>Shigella spp</i>; <i>Proteus mirabilis</i>; <i>M. morganii</i>; <i>Brucella sp</i>; <i>Neisseria sp</i>; <i>Bordetella pertussis</i>. Cubeta con 36 jeringas de 10 ml SU VENTA REQUIERE RECTA MÉDICA	Cada jeringa de 10 ml contiene: Cloxacilina (sódica) 0.20 g Ampicilina (sódica) 0.075 g Vehículo c.b.p. 10 ml	Bovinos: 10 ml por cuarto afectado, cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis. Ovinos y caprinos: 5 ml por cuarto afectado cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis. Vía intramamaria.

SISTEMA DIGESTIVO

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 INDIGEST INJECTABLE Q-7965-096	Solución inyectable restaurador gastro-hepato-pancreático. Normalizador del funcionamiento gástrico, duodenal y biliar, indicado en aquellas situaciones en que se requiere una estimulación de las secreciones digestivas, tales como indigestiones, anorexia, toxemias, cetosis, intoxicaciones. Frasco con 100 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contienen: Menbutone 10 g Agua inyectable c.b.p. 100 ml	1 ml (100 mg) por cada 10 kg de peso. Bovinos adultos: 20-40 ml Terberos: 5-15 ml Ovinos y caprinos: 5-10 ml Equinos: 20-30 ml Porcinos: 5-10 ml Caninos: 0.1 ml/kg Vía intramuscular o intravenosa lenta.

BIOLÓGICOS

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
  INMOUDULEN B-7965-076	Solución inyectable inmunomodulador, bioestimulante de la inmunidad inespecífica. Provee un restablecimiento de la salud de los animales de las enfermedades infecciosas. Frasco de 50 ml	Cada 100 ml contienen: Células inactivadas <i>Propionibacterium granulosum</i> 25 mg Lipopolisacárido procedente de células de <i>E. coli</i> 2 mg Vehículo c.b.p. 100ml	Porcinos: 0.5-1 ml/10 kg de peso vivo. Bovinos: 10 ml por animal pudiéndose repetir a las 48 horas. Terneros recién nacidos hasta los 100 kg: 0.5-1 ml/10 kg. Caninos: 1 ml con un peso inferior a 10 kg y 2 ml peso superior a los 10 kg. Equinos: Yeguas 5 ml y potros 2 ml por animal. Vía intramuscular o subcutánea.
  INMUNAIR 17.5 B-7965-078	Inmunomodulador, bioestimulante de la inmunidad inespecífica. Reduce mortalidad, síntomas clínicos y/o lesiones producidas por enfermedades infecciosas. Frasco con 500 ml.	Cada ml contiene: Células inactivadas <i>Propionibacterium acnes</i> 0.17 mg Lipopolisacárido procedente de células de <i>E. coli</i> 0.05 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	0.5 a 1 ml/10 kg de peso vivo, cada 24 horas durante tres días consecutivos. Vía oral a través del agua de bebida.

CARDIOLOGÍA

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
  BANACEP VET 5 mg Q-7965-128	Comprimido indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros e insuficiencia renal crónica (proteinuria) en gatos. Caja con 140 comprimidos SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada comprimido contiene: Benazepril (equivalente a 5 mg de hidrocloreuro de Benazepril) 4.6 mg Excipiente c.b.p. 1 comprimido	Perros con menos de 10 kg de peso: 1/2 a 1 comprimido. Perros de 10 a 20 kg de peso: 1 a 2 comprimidos (equivalente de 0.25 a 0.5 mg/kg). Gatos de 2.5 a 5 kg de peso: 1/2 comprimido. Gatos de 5 a 10 kg: 1 comprimido (equivalente de 0.5 a 1 mg/kg. Administrar una vez al día. Vía oral.
  BANACEP VET 20 mg Q-7965-129	Comprimido indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros. Caja con 140 comprimidos SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada comprimido contiene: Benazepril (equivalente a 20 mg de hidrocloreuro de Benazepril) 18.42 mg Excipiente c.b.p. 1 comprimido	Perros de 20 a 40 kg peso corporal: 1/2 comprimido. Perros de 40 a 80 kg peso corporal: 1 comprimido (equivalente de 0.25 mg/kg peso corporal). Administrar una vez al día. Vía oral.

REPRODUCCIÓN

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 BENZOATO DE ESTRADIOL Q-7965-121	Solución inyectable indicada para la expulsión de placenta retenida, piómetra, inducción del celo y sincronización del celo. Frasco con 100 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.	Cada 100 ml contienen: Benzoato de Estradiol 100 mg Vehículo c.b.p. 100 ml	Aplicar de 1 a 2.5 mg equivalente a 1 - 2.5 ml totales según indicación y criterio profesional. Vía intramuscular.
 CIPIONATO DE ESTRADIOL Q-7965-120	Solución inyectable indicada para la corrección del anestro, tratamiento de cuerpos lúteos persistentes, piómetra, expulsión de placenta y fetos momificados retenidos. Sincronización de celo en programas de inseminación artificial a tiempo fijo. En caninos, indicado como terapia de reposición en hembras castradas que sufren de incontinencia urinaria, pseudopreñez e hipertrofia prostática. En bovinos y caninos puede ser utilizado para provocar la interrupción de la gestación no deseada. Frasco con 100 ml SU VENTE REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada 100 ml contienen: Cipionato de Estradiol 100 mg Vehículo c.b.p. 100 ml	Anestro: Vacas 3 a 5 mg (3 a 5 ml), Yeguas 5 a 10 mg (5 a 10 ml), Cerdas y ovejas 0.5 a 1 mg (0.5 a 1 ml). Piómetra, placenta retenida y expulsión de fetos momificados: Vacas 10 mg (10 ml). Perras: Pseudopreñez: 0.5 a 1 mg (0.5 a 1 ml). Piometra: 1 a 2 mg (1 a 2 ml). Hipertrofia prostática: 1 a 2 mg (1 a 2 ml). Interrupción de la preñez: 0.5 a 2 mg (0.5 a 2 ml) aplicados dentro de las 72 horas posteriores al coito. Gatas: Anestro: 0.25 a 0.5 mg (0.25 a 0.5 ml). Vía intramuscular.
 DECOMOTON Q-7965-139	Solución inyectable con actividad reguladora en parto, retención láctea, agalactia, retención de placenta y coadyuvante en el síndrome de mastitis, metritis y agalactia (MMA). Caja con 10 ampulas de 10 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada ml contiene: Carbetocina 0.05 mg Vehículo y estabilizantes c.b.p. 1 ml	Porcinos: Regulador del parto y retención láctea postparto; 0.12 ml por cada 10 kg de peso, en dosis única 2 ml por cerda de 150 kg. Bovinos (Leche): 0.3-0.4 ml por cada 10 kg de peso en dosis única; 10 ml por vaca de entre 400-500 kg. Otras indicaciones 0.24-0.4 ml por 10 kg. Vía intramuscular o intravenosa muy lenta.
 PLUSSET Q-7065-082	Mezcla de gonadotropina hipofisarias de origen porcino para la inducción a la superovulación en bovinos. Caja con 2 viales de 500 UI de FSH y 500 UI de LH SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.	Cada frasco de liofilizado contiene: FSH (Hormona Foliculo Estimulante) 500 UI LH (Hormona Luteinizante) 500 UI Cada frasco de diluyente contiene: Solución apirógena, estéril e inyectable 20 ml	Disolver cada vial de liofilizado con 10 ml de diluyente estéril. Aplicar de la siguiente manera: Día 1: 3 ml. Día 2: 2.5 ml. Día 3: 2.0 ml. Día 4: 1.5 ml. Día 5: 1 m l, cada 12 horas de preferencia a las 8 am y 8 pm a partir del día 11 del ciclo estral. Vía exclusivamente intramuscular.
 PLUSERALR 0.6 Q-7965-118	Dispositivo intravaginal para el control del ciclo estral en vaquillonas/novillas y vacas. Tratamiento del anestro postparto. Acortamiento del período de parto concepción. Bolsa con 10 dispositivos intravaginales SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.	Cada dispositivo intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano3,20-diona) micronizada 0,6 g Silicona Inerte c.s.p. 1 dispositivo intravaginal.	0,6 g de Progesterona por animal. Anestro: Día 0: ID+BE2, Día 8: RD+eCG+PG, Día 9: BE1; Día 10: IA Celo silencioso: Día 0: ID+BE2, Día 7: RD, Día 9: IA Ovario quístico: Día 0: ID, Día 6: PG, Día 7: PG, Día 9: RD; Día 10: IA Sincronización de celo: Día 0: ID+BE2, Día 7: RD+PG, Día 8: BE1, Día 9: IATF. Vía intravaginal.

REPRODUCCIÓN

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
 PLUSELAR 1,2 Q-7965-119	Dispositivo intravaginal para el control del ciclo estral en vaquillonas/novillas y vacas. Tratamiento del anestro postparto. Acortamiento del período de parto concepción. Bolsa con 10 dispositivos intravaginales SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada dispositivo intravaginal contiene progesterona (4-pregnano3,20-diona) micronizada 1,2 g Silicona Inerte c.s.p. 1 dispositivo intravaginal	1,2 g de Progesterona por animal. Anestro: Día 0: ID+BE2, Día 8: RD+eCG+PG, Día 9: BE1; Día 10: IA Celo silencioso: Día 0: ID+BE2, Día 7: RD, Día 9: IA Ovario quístico: Día 0: ID, Día 6: PG, Día 7: PG, Día 9: RD; Día 10: IA Sincronización de celo: Día 0: ID+BE2, Día 7: RD+PG, Día 8: BE1, Día 9: IATF. Vía intravaginal.
 PLUSERELINA Q-7965-131	Solución inyectable indicado como inductor de la ovulación, tanto en caso de desórdenes ováricos (quistes) como en programas de mejoramiento en los índices de concepción en las especies indicadas. Frasco con 50 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada ml contiene: Buserelina acetato 0.0042 mg (equivalente a 0.0040 mg de Buserelina) Vehículo c.b.p. 1 ml	Bovinos (hembras): 0.01 a 0.02 mg o el equivalente de 2.5 a 5 ml por peso corporal total del animal. Yeguas: 0.04 mg equivalente a 10 ml por el peso corporal total del animal. Vía intramuscular profunda, subcutánea o intravenosa. En equinos administrar preferentemente por vía intravenosa.
 VETEGLAN Q-7965-083	Solución inyectable indicada para la inducción y sincronización del estro, tratamientos del subestro, endometriosis crónica, Piometra, inducción del aborto terapéutico e inducción al parto. De amplio índice terapéutico y no afecta la fertilidad. Frasco con 20 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada ml de solución contiene: d-cloprostenol 0.075 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	Vacas: 2 ml por animal. Cerdas: 1 ml por animal. Yeguas: 1ml por animal. Vía intramuscular.
 VETEGON eCG Q-7965-130	Solución inyectable indicada como tratamiento para la inducción y sincronización del estro (celo), de la ovulación y para revertir el anestro. En machos estimula el desarrollo del tejido intersticial de los testículos y de las glándulas sexuales (vesículas seminales y próstata). También, se utiliza para mejorar la calidad y cantidad de semen y la disfunción del libido. Caja con frasco liofilizado de 5000 UI y Caja con 25 ml de diluyente estéril SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA	Cada frasco liofilizado contiene: Gonadotropina Coriónica Equina (eCG, PMSG) 5,000 UI Cada frasco con diluyente contiene: Agua estéril 25 ml	Inducción y sincronización de celo y ovulación en vacas o vaquillonas en anestro: 400 a 600 UI (2 a 3 ml) por animal. Superovulación: 2,500 a 3,000 U.I. (12.5 a 15 ml) por el peso total del animal entre el día, se recomienda administrar en el día 10 y 11 del ciclo estral (como día 0). Se recomienda administrar 48 horas después de la administración de VETEGON eCG, una dosis de Prostaglandinas F2 alfa. Administrar como dosis única. Vía intramuscular.

VITAMINAS Y MINERALES

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN																				
  ROBORANTE GOLD Q-7965-132	Tónico reconstituyente y fortificante (para deficiencias y alteraciones del metabolismo). Para aumentar la vitalidad en animales debilitados, aumento de la productividad y reducción de agotamiento. Frasco con 100 y 250 ml	Cada 100 ml contiene: <table><tr><td>Caseína-péptidos</td><td>5 g</td></tr><tr><td>Calcio-fosforil-colina cloruro</td><td>5 g</td></tr><tr><td>Vehículo c.b.p.</td><td>100 ml</td></tr></table>	Caseína-péptidos	5 g	Calcio-fosforil-colina cloruro	5 g	Vehículo c.b.p.	100 ml	Bovinos (carne y leche): 10-25 ml. Equinos: 15-20 ml Terneros: 5-15 ml Ovinos: 3-5 ml Corderos: 3-5 ml Porcinos: 5-10 ml Lechones: 1-3 ml Caninos: 0.5-5 ml Equivalente a 1.25 mg de caseína péptidos y 1.25 mg calcio-fosforil colina cloruro por kg de p.c. Aplicar una segunda dosis al día 6 y la tercera dosis al día 30 posterior a la primera dosis, a criterio del Médico Veterinario. Vía intramuscular, subcutánea e intravenosa.														
Caseína-péptidos	5 g																						
Calcio-fosforil-colina cloruro	5 g																						
Vehículo c.b.p.	100 ml																						
  VITAMIN AD3E CALIER Q-7965-061	Vitamínico reconstituyente indicado para el tratamiento de prevención de las deficiencias de las vitaminas de la fórmula en bovinos, porcinos, caprinos, becerros, potros, equinos y ovinos. En hembras y machos reduce los problemas de infertilidad y favorece a los machos al inicio de la engorda. Frasco con 500 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 5 ml contienen: <table><tr><td>Vitamina A</td><td>500,000 UI</td></tr><tr><td>Vitamina D</td><td>75,000 UI</td></tr><tr><td>Vitamina E</td><td>50 UI</td></tr><tr><td>Vehículo c.b.p.</td><td>5 ml</td></tr></table>	Vitamina A	500,000 UI	Vitamina D	75,000 UI	Vitamina E	50 UI	Vehículo c.b.p.	5 ml	Bovinos: 3 a 6 ml Equinos: 3 a 6 ml Porcinos: 2 a 3 ml Ovinos: 2 a 3 ml Caprinos: 2 a 3 ml Becerras y potros: 2 a 3 ml. Vía intramuscular.												
Vitamina A	500,000 UI																						
Vitamina D	75,000 UI																						
Vitamina E	50 UI																						
Vehículo c.b.p.	5 ml																						
  BUTAFOS CALIER Q-7965-069	Solución inyectable indicado como reconstituyente general, en el tratamiento de enfermedades crónicas, casos de estrés, ejercicio excesivo, debilidad, anemia, infertilidad y tetania, por su contenido de vitamina B12 es eficaz en el crecimiento corporal en la protección del hígado y la formación de glóbulos rojos. Frasco de 50, 100 y 250 ml SU VENTA REQUIERE RECTA MÉDICA	Cada 100 ml contiene: <table><tr><td>Butafosfán Acido 1-(n-butilamino) 1-metiletil fosforoso)</td><td>10 g</td></tr><tr><td>Vitamina B12</td><td>0.005 g</td></tr><tr><td>Vehículo c.b.p.</td><td>100 ml</td></tr></table>	Butafosfán Acido 1-(n-butilamino) 1-metiletil fosforoso)	10 g	Vitamina B12	0.005 g	Vehículo c.b.p.	100 ml	Bovinos y equinos: 10-20 ml Potros y terneros: 5-12 ml Ovinos y caprinos: 2.5-5 ml Corderos y cabritos: 1.5-2.5 ml Porcinos: 2.5-10 ml Lechones: 1-2.5 ml Caninos: 0.5-5 ml Felinos, aves de combate y animales pilíferos: 0.5-1 ml Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.														
Butafosfán Acido 1-(n-butilamino) 1-metiletil fosforoso)	10 g																						
Vitamina B12	0.005 g																						
Vehículo c.b.p.	100 ml																						
  CALCIO-CALIER FORTE Q-7965-094	Solución inyectable coadyuvante para el tratamiento de paresia hipocalcémica, tetanias, paraplegias, raquitismo, osteomalacia, alergias, intoxicaciones, neurosis, eclampsia de las cerdas y de las perras lactantes. Debilidad en las contracciones del parto. Frasco con 100 y 250 ml	Cada 100 ml contienen: <table><tr><td>Borogluconato de calcio (equivalente a 4.6 g de Ca)</td><td>55.280 g</td></tr><tr><td>Cloruro de magnesio 6H2O (equivalente a 0.768 g de Mg)</td><td>6.430 g</td></tr><tr><td>Hiposulfito magnésico (Equivalente a 0.031 g de Mg; 0.08 g de P)</td><td>0.338 g</td></tr><tr><td>Vehículo c.b.p.</td><td>100 ml</td></tr></table>	Borogluconato de calcio (equivalente a 4.6 g de Ca)	55.280 g	Cloruro de magnesio 6H2O (equivalente a 0.768 g de Mg)	6.430 g	Hiposulfito magnésico (Equivalente a 0.031 g de Mg; 0.08 g de P)	0.338 g	Vehículo c.b.p.	100 ml	Aplicar de 0.16 a 0.49 ml/kg de peso (equivalente a 7.5 a 22.5 mg de calcio/kg). Vía subcutánea o intravenosa lenta.												
Borogluconato de calcio (equivalente a 4.6 g de Ca)	55.280 g																						
Cloruro de magnesio 6H2O (equivalente a 0.768 g de Mg)	6.430 g																						
Hiposulfito magnésico (Equivalente a 0.031 g de Mg; 0.08 g de P)	0.338 g																						
Vehículo c.b.p.	100 ml																						
  CALIER B FORTE Q-7965-063	Solución inyectable indicado para la prevención y tratamiento de deficiencia de las vitaminas del complejo B, antianémico, reconstituyente, estimulante, fortificante y antineurítico. Frasco con 100 y 250 ml	Cada 100 ml contiene: <table><tr><td>D-Pantenol</td><td>250 mg</td></tr><tr><td>Extracto de hígado inyectable</td><td>10 g</td></tr><tr><td>Niacinamida</td><td>7.5 g</td></tr><tr><td>Piridoxina clorhidrato</td><td>500 mg</td></tr><tr><td>Tiamina clorhidrato</td><td>500 mg</td></tr><tr><td>Vitamina B2 riboflavina</td><td></td></tr><tr><td>5 fosfato sódico</td><td>200 mg</td></tr><tr><td>Vitamina B12</td><td></td></tr><tr><td>Cianocobalamina</td><td>15,000 mcg</td></tr><tr><td>Vehículo c.b.p.</td><td>100 ml</td></tr></table>	D-Pantenol	250 mg	Extracto de hígado inyectable	10 g	Niacinamida	7.5 g	Piridoxina clorhidrato	500 mg	Tiamina clorhidrato	500 mg	Vitamina B2 riboflavina		5 fosfato sódico	200 mg	Vitamina B12		Cianocobalamina	15,000 mcg	Vehículo c.b.p.	100 ml	Bovinos (carne y leche) y Equinos: 5 a 10 ml Porcinos: 3 a 5 ml Ovinos y Caprinos: 2 a 3 ml Caninos y Felinos: 1 a 3 ml Vía intramuscular e intravenosa.
D-Pantenol	250 mg																						
Extracto de hígado inyectable	10 g																						
Niacinamida	7.5 g																						
Piridoxina clorhidrato	500 mg																						
Tiamina clorhidrato	500 mg																						
Vitamina B2 riboflavina																							
5 fosfato sódico	200 mg																						
Vitamina B12																							
Cianocobalamina	15,000 mcg																						
Vehículo c.b.p.	100 ml																						

VITAMINAS Y MINERALES

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN																																																				
  DEXTROVIT CALIER Q-7965-062	Solución inyectable vitamínico reconstituyente, ampliamente recomendado en caso de estrés, manejos excesivos y cambio de alimento. Para animales convalecientes o enfermos que han sufrido vómitos, deshidratación, diarrea, enfermedades crónicas y requieren un rápido aporte de vitaminas, minerales, aminoácidos y carbohidratos. Frasco con 500 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA	Cada 100 ml contienen: <table><tr><td>Acetato de sodio</td><td>250 mg</td></tr><tr><td>Cloruro de calcio</td><td>15 mg</td></tr><tr><td>Cloruro de potasio</td><td>20 mg</td></tr><tr><td>Dextrosa anhidra</td><td>5 g</td></tr><tr><td>DL-fenilalanina</td><td>3 mg</td></tr><tr><td>DL-isoleucina</td><td>2 mg</td></tr><tr><td>DL-triptófano</td><td>1 mg</td></tr><tr><td>DL-valina</td><td>5 mg</td></tr><tr><td>D-pantenol</td><td>5 mg</td></tr><tr><td>Glutamato monosódico</td><td>4 mg</td></tr><tr><td>L-arginina clorhidrato</td><td>2.5 mg</td></tr><tr><td>L-cisteína clorhidrato</td><td>1 mg</td></tr><tr><td>L-histidina clorhidrato</td><td>1 mg</td></tr><tr><td>L-leucina</td><td>4 mg</td></tr><tr><td>L-lisina clorhidrato</td><td>3 mg</td></tr><tr><td>L-metionina</td><td>1 mg</td></tr><tr><td>L-treonina</td><td>2 mg</td></tr><tr><td>Nicotinamida</td><td>150 mg</td></tr><tr><td>Piridoxina clorhidrato</td><td>10 mg</td></tr><tr><td>Sulfato de magnesio</td><td>20 mg</td></tr><tr><td>Tiamina clorhidrato</td><td>10 mg</td></tr><tr><td>Vitamina B12</td><td></td></tr><tr><td>Cianocobalamina</td><td>3,000 mcg</td></tr><tr><td>Vitamina B2 riboflavina</td><td></td></tr><tr><td>5 fosf. sódico</td><td>4 mg</td></tr><tr><td>Vehículo c.b.p.</td><td>100 ml</td></tr></table>	Acetato de sodio	250 mg	Cloruro de calcio	15 mg	Cloruro de potasio	20 mg	Dextrosa anhidra	5 g	DL-fenilalanina	3 mg	DL-isoleucina	2 mg	DL-triptófano	1 mg	DL-valina	5 mg	D-pantenol	5 mg	Glutamato monosódico	4 mg	L-arginina clorhidrato	2.5 mg	L-cisteína clorhidrato	1 mg	L-histidina clorhidrato	1 mg	L-leucina	4 mg	L-lisina clorhidrato	3 mg	L-metionina	1 mg	L-treonina	2 mg	Nicotinamida	150 mg	Piridoxina clorhidrato	10 mg	Sulfato de magnesio	20 mg	Tiamina clorhidrato	10 mg	Vitamina B12		Cianocobalamina	3,000 mcg	Vitamina B2 riboflavina		5 fosf. sódico	4 mg	Vehículo c.b.p.	100 ml	Bovinos, equinos y porcinos: 100 ml/50 kg de peso Ovinos, caprinos, becerros, potrillos y lechones: 50 a 120 ml/25 kg de peso. Vía intravenosa, intramuscular o subcutánea.
Acetato de sodio	250 mg																																																						
Cloruro de calcio	15 mg																																																						
Cloruro de potasio	20 mg																																																						
Dextrosa anhidra	5 g																																																						
DL-fenilalanina	3 mg																																																						
DL-isoleucina	2 mg																																																						
DL-triptófano	1 mg																																																						
DL-valina	5 mg																																																						
D-pantenol	5 mg																																																						
Glutamato monosódico	4 mg																																																						
L-arginina clorhidrato	2.5 mg																																																						
L-cisteína clorhidrato	1 mg																																																						
L-histidina clorhidrato	1 mg																																																						
L-leucina	4 mg																																																						
L-lisina clorhidrato	3 mg																																																						
L-metionina	1 mg																																																						
L-treonina	2 mg																																																						
Nicotinamida	150 mg																																																						
Piridoxina clorhidrato	10 mg																																																						
Sulfato de magnesio	20 mg																																																						
Tiamina clorhidrato	10 mg																																																						
Vitamina B12																																																							
Cianocobalamina	3,000 mcg																																																						
Vitamina B2 riboflavina																																																							
5 fosf. sódico	4 mg																																																						
Vehículo c.b.p.	100 ml																																																						
  PROMOTOR L 47.0 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN A-7965-005	En momentos de altas exigencias productivas, momentos de estrés, en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en los estados de depauperación (debilidad) convalecencia de los animales, para mejorar la viabilidad de los animales en sus primeros días de vida, en los ritmos reproductivos intensos. En los periodos de gestación y lactancia. Para mejorar el rendimiento y el índice de conversión de los animales. Frasco con 20 y 100 ml, 1 y 5 L	Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: Nicotinamida; D-Pantenol; Vitamina B1 HCL; Vitamina B2; Vitamina B6; Biotina. El hidrolizado cultivado sobre sustrato vegetal aporta: L-Alanina; L-Arginina; L-Ácido Aspártico; L-Fenilalanina; L- Cistina; L-Ácido Glutámico; L-Glicina; L-Histidina; L-Isoleucina; L-Leucina; L-Lisina; L-Metionina; L-Prolina; L-Serina; L-Treonina; L-Tirosina; L- Valina; L-Triptófano y Dextrosa.	Aves: 0.5 a 1 mL por litro de agua de bebida durante 5 días. Abejas: 5 mL por cada litro de solución azucarada. Conejos: 2 mL por cada litro de agua de bebida, durante 7 días. Bovinos (productores de carne y leche), Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos y Felinos: 2 mL por cada 10 kg de peso vivo por día, durante 4-5 días. Pavos, Codorniz, Patos, Canarios, Pericos: 5 mL por cada litro de agua de bebida, equivalente a 12 gotas por cada 100 mL de agua, durante 5 a 7 días. Vía oral a través de agua de bebida.																																																				
  PROMOTOR L-GEL	Indicado en los desequilibrios y deficiencias nutritivas, donde se requiere complementar nutrientes esenciales, celulares o metabólicos que permitan la recuperación de carencias, o el retorno al bance positivo energético y proteico. Jeringa de 30 g	Vitamina A10.000.000 UI; vitamina D3 2.000.000 UI; Vitamina K3 0.5g; Nicotinamida 16.25 g; D-Pantenol 7.5g; Tiamina (B1) 1.75; Riboflavina (B2) 2.5 g; Piridoxina (B6) 1.125g; Vitamina B12 1.25 mg, vitamina B15 0.5 mg; Inositol 2.5 g; Biotina 1.000 mcg; Vehículo c.b.p. 1.000 ml; *Hidrolizado de levadura 470 ml; L-Alanina 11.5 g, L-arginina 6.1 g, L-Ácido aspártico 9.5 g, L-Cistina 2.1 g, L-Fenilalanina 5.5 g, L-Ácido Glutámico 21.5 g, L-Glicina 9.3 g, L-Histidina 4.7 g, L-Isoleucina 6 g, L-Leucina 12.5 g, L-Lisina 9.5 g, L-Metionina 2.2 g, L-prolina 9.5 g, L-Serina 7.0 g, L-Treonina 5.0 g, L-Tirosina 5.3 g, L-Triptófano 2.0, L-Valina 6.2 g	1 g por cada kg de peso. Vía oral.																																																				

ANTIPARASITARIOS

PRODUCTO	INDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	FÓRMULA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
  IVERTIN Q-7965-080	Bovinos: hipodermosis, nematodosis, gastrointestinal, nematodosis pulmonar, parasitosis externa y sarna. Ovinos: estrosis, nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar, parasitosis externas y sarna. Porcinos: Nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar, parasitosis externa y sarna. Frasco con 500 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contienen: Ivermectina 1 g Vehículo c.b.p. 100 ml	Bovinos y ovinos: 0.20 mg/kg (equivalente a 0.02 ml/kg) Porcinos: 0.30 mg/kg (equivalente a 0.03 ml/kg) en dosis única. Vía subcutánea.
  IVERTIN 3.5% L.A. Q-7965-067	Endectocida de larga acción indicado para el control y tratamiento de gusanos redondos, así como ectoparásitos, moscas, piojos y ácaros de la sarna. Frasco con 100 y 500 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contienen: Ivermectina 3,500 mg Vehículo c.b.p. 100 ml	Bovinos: 1ml por cada 50 kg. Vía subcutánea en el área de la escapula (paleta) o en el cuello.
  ZODALBEN 10% Q-7965-103	Suspensión oral para el control y tratamiento de las parasitosis gastrointestinales, pulmonares y la distomatosis hepática de los bovinos, ovinos y equinos. Espectro de actividad: <i>Ostertagia spp.</i> (Inclusive L4-hipobióticas), <i>Haemonchus spp.</i>, <i>Trichostrongylus spp.</i>, <i>Oesophagostomum spp.</i>, <i>Bunostomum spp.</i>, <i>Nematodirus spp.</i>, <i>Cooperia spp.</i>, <i>Strongyloides spp.</i>, <i>Dictyocaulus spp.</i>, <i>Moniezia spp.</i>, <i>Chibertia ovina</i> y <i>Fasciola hepática</i>. Frasco con 1 y 5 L SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contienen: Albendazol 10.0 g Excipientes c.b.p. 100 ml	Bovinos: Para parásitos susceptibles, trematodos hepáticos adultos, cestodos gastrointestinales: 10 ml por cada 200 kg de p.v. (equivalente a 5 mg de Albendazol por kg de p.v.) Ovinos: Para parásitos susceptibles, trematodos hepáticos adultos: 0.5 ml por cada 10 kg de p.v. (equivalente a 5 mg de Albendazol por kg de p.v.) Equinos: 1 ml por cada 14 kg de p.v. (equivalente a 7.5 mg de Albendazol por kg de p.v.). Vía oral.
  ZIPYRAN PLUS SABOR Q-7965-115	Parasitocida indicado para el tratamiento de nematodosis gastrointestinal, pulmonar y céstodos en perros. Caja con 10 y 250 tabletas SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada tableta contiene: Prazicuantel 50 mg Pirantel (Embonato) 50 mg Febantel 150 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta	1 tableta por cada 10 kg de peso. Perros pequeños o cachorros: De 0.5 a 2 kg de peso ¼ tableta, De 2 a 5 kg de peso ½ tableta, De 5 a 10 kg de peso 1 tableta Perros medianos: De 10 a 20 kg de peso 2 tabletas, De 20 a 30 kg de peso 3 tabletas Perros grandes: De 30 a 40 kg de peso 4 tabletas. Vía oral.
  EQ-VERM P Q-7965-111	Es un gel endectocida con sabor a manzana indicado para el tratamiento de parásitos cutáneos, pulmonares, gastrointestinales y gasterófilos adicionado con vitamina B12 como factor antianémico. Jeringa con 10 ml SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA	Cada 100 ml contiene: Ivermectina 1.200 g Prazicuantel 9.000 g Vitamina B12 0.050 g Excipiente c.b.p. 100 ml	1 ml / 60 kg de peso vivo (200 ml de ivermectina por kg) 1 jeringa con 10 ml es suficiente para tratar 600 kg de peso Vía oral

COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR ANIMAL

En Calier estamos convencidos que para mejorar la salud y bienestar de las personas, tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos como organización a asegurar que nuestros productos y servicios garanticen la salud y el bienestar animal. Este es nuestro compromiso.



 CALIER COMPANIES

EUROPE

Albania
Austria
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
England
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Holland

Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Macedonia
Malta
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovenia
Spain
Sweden
Ukraine

ASIA-PACIFIC

Australia
Indonesia
Japan
Malaysia
P.R. China
Pakistan
Philippines

Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

MIDDLE EST-AFRICA

Algeria
Azerbaijan
Bahrain
Burkina Faso
Cameroon
Egypt
Iran
Israel
Ivory Coast
Jordan

Lebanon
Libya
Mali
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Sudan
Turkey
United Arab Emirates

AMERICA

Argentina
Belize
Brazil
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
U.S.A.
Venezuela



De venta en:

ARBiotech[®]
Animal Reproduction Biotechnology

C **CALIER**
COMPROMETIDOS CON
EL BIENESTAR ANIMAL